

Листовка: информация за пациента

Празолид 20 mg стомашно-устойчиви таблетки Prazolid 20 mg gastro-resistant tablets

Пантопразол (*Pantoprazole*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 2 седмици не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Празолид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Празолид
3. Как да приемате Празолид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Празолид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



1. Какво представлява Празолид и за какво се използва

Празолид съдържа активното вещество пантопразол, което блокира „помпата“, която произвежда солна киселина в стомаха. По този начин продуктът намалява киселинността във Вашия стомах.

Празолид се използва за краткосрочно лечение на симптомите на стомашен рефлукс (като например киселини в стомаха и кисели оригвания) при възрастни. Стомашният рефлукс е връщане на киселинно стомашно съдържимо в хранопровода, което може да предизвика възпаление или болка. Това може да доведе до симптоми като чувство на пареща болка в гърдите, достигаща до гърлото (киселини в стомаха) и неприятен кисел вкус в устата (кисело оригване).

Вие може да почувствате облекчаване на симптомите на киселинен рефлукс и киселини в стомаха след само един ден лечение с Празолид, но това лекарство не е предназначено да води до незабавно облекчение. Може да е необходимо да приемате таблетките 2-3 последователни дни за облекчаване на симптомите.

Ако след 2 седмици не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Празолид

Не приемайте Празолид

- ако сте алергични към пантопразол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако приемате лекарства, съдържащи атазанавир (за лечение на HIV-инфекция);



- ако сте на възраст под 18 години;
- ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Празолид.

Кажете на Вашия лекар:

- ако сте били лекувани за киселини в стомаха или стомашно разстройство в продължение на 4 седмици или повече;
- ако сте на възраст над 55 години и приемате ежедневно без лекарско предписание лекарство срещу лошо храносмилане;
- ако сте на възраст над 55 години и имате новопоявили се или наскоро променени симптоми ;
- ако сте преживели операция на стомаха или сте имали стомашна язва;
- ако имате чернодробни проблеми или жълтеница (пожълтяване на кожата или очите);
- ако редовно посещавате Вашия лекар за сериозни оплаквания или заболявания;
- ако трябва да провеждате ендоскопско изследване или изследване на дъха, наречено С-уреен тест;
- ако някога сте получавали кожна реакция след лечение с лекарство, подобно на Празолид, което намалява стомашната киселина.

Ако получите обрив по кожата, особено в участъци, изложени на слънце, информирайте Вашия лекар веднага когато Ви бъде възможно, тъй като може да се наложи да спрете лечението с Празолид. Не забравяйте също да споменете всички други неблагоприятни последици, като болка в ставите.

Кажете на Вашия лекар незабавно, ако преди или след приемането на това лекарство, забележите някой от следните симптоми, които може да са признак на друго, по-сериозно заболяване:

- нежелана загуба на телесно тегло (несвързана с диета или физически натоварвания);
- повръщане, особено ако се повтаря;
- повръщане на кръв (може да изглежда като утайка на кафе в повърнатите материци);
- ако забележите кръв във Вашите изпражнения (може да изглеждат черни или смолисти на вид);
- затруднение или болка при преглъщане;
- изглеждате бледи или се чувствате отпаднал (анемия);
- болки в гърдите;
- болки в стомаха;
- тежка и/или продължителна диария, защото Празолид се свързва с леко повишена честота на инфекциозна диария.

Вашият лекар може да реши, че имате нужда от допълнителни изследвания.

Ако трябва да провеждате кръвни изследвания, кажете на Вашия лекар, че приемате това лекарство.

Вие може да почувствате облекчаване на симптомите на киселинен рефлукс и киселини в стомаха след само един ден лечение с Празолид, но това лекарство не е предназначено да води до незабавно облекчение.

Вие не трябва да приемате Празолид като профилактично лечение.

Ако сте имали повтарящи се симптоми на стомашни киселини или лошо храносмилане, не забравяйте редовно да посещавате Вашия лекар.

Деца и юноши

Празолид 20 mg стомашно-устойчиви таблетки не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години, поради недостатъчно данни за ефикасността и безопасността.



